

Vážení čtenáři, na stránkách Praktického lékárenství se v každém čísle setkáváte s autodidaktickým testem, který ověří, jak pečlivě jste pročetli publikované články. Jistě Vás potěší, že za správné zodpovězení otázek nově můžete získat body ČLnK (3 body při 75–90% úspěšnosti, 5 bodů při 90% správných odpovědích). Přístup na testy je umožněn pouze předplatitelům přes www.praktickelekarenstvi.cz, najdete ho vpravo v menu časopisu spolu s dalšími organizačními instrukcemi. Test se skládá ze 20 otázek, na každou existuje alespoň jedna správná odpověď. Odpovědi na otázky jsou v souladu s informacemi v příslušných článcích, řešení najdete v příštím čísle. Odpovědi vyplňujte do 21. listopadu, poté bude test z tohoto čísla uzavřen.

1 Podání probiotik v průběhu těžké akutní pankreatitidy je nyní:

- a) obecně indikované
- b) možné
- c) v indikovaných případech doporučené
- d) kontraindikované

2 Podání probiotik je jednoznačně indikováno u:

- a) infekčních průjmů
- b) cestovatelských průjmů
- c) průjmů po antibakteriální léčbě
- d) žádné z těchto chorob

3 Warfarin byl nalezen v siláži, která obsahovala:

- a) těžkou tečkovanou
- b) komonici lékařskou
- c) lípu srdčitou
- d) kopřivu obecnou

4 S forma warfarinu se metabolizuje přes:

- a) přes izoenzymové jednotky CYP3A4 a CYP1A2
- b) cytochrom P450
- c) přes izoenzymovou složku CYP2C9
- d) přes jednotku CYP JC2

5 Warfarinizovaný pacient by neměl užívat:

- a) paracetamol
- b) piroxicam
- c) metamizol
- d) trimethoprim

6 Který z následujících symptomů není spojen s metabolickým syndromem?

- a) centrální typ obezity
- b) dyslipidemie
- c) poruchy krevní srážlivosti
- d) diabetes mellitus I.

7 K primární prevenci metabolického syndromu zařazujeme:

- a) sledování poruch krevní srážlivosti
- b) výživu
- c) včasnou léčbu hypertenze
- d) léčbu centrálního typu obezity

8 Tuková tkáň je pro organismus zdrojem nežádoucích:

- a) katecholaminů
- b) cytokinů chronického zánětu
- c) testosteronu (u mužů)
- d) kilogramů tělesné hmotnosti

9 Mezi CNS nežádoucí účinky kortikoidní terapie nepatří:

- a) deprese
- b) nespavost
- c) euforie
- d) vertigo

10 Nejdelší poločas účinku z perorálních kortikoidů má:

- a) dexamethason
- b) prednison
- c) hydrokortison
- d) methylprednisolon

11 Gastrointestinální obtíže z imunosupresiv vyvolávají:

- a) mykofenolát mofetil
- b) cyklofosamid
- c) methotrexát
- d) mTOR inhibitory

12 Pro intravenózní imunoglobuliny neplatí:

- a) u autoimunitních onemocnění se podávají ve vysokých dávkách
- b) jsou dobře snášeny
- c) podráždění mozkových blan je závažnou komplikací léčby
- d) charakteristické jsou gastrointestinální nežádoucí účinky

13 Blistr ve farmácii znamená:

- a) pásové balení perorálních kusových léčiv, které vzniká splením dvou vrstvených hliníkových (celofánových) fólií za tepla
- b) protlačovací balení, primární obal tuhých dávkovaných léčiv, který se skládá z plastické fólie (PVC, polystyren) v níž jsou prohlubeniny (dvorce) pro umístění jednotlivých tablet, tobolek. Tvarovaná fólie se zalepuje vrstvenou hliníkovou fólií
- c) pomůcka, která slouží k přehlednému uspořádání a spolehlivému dennímu nebo týdenčnímu dávkování léčiv doma i na cestách
- d) systém distribuce léčiv, připravovaný v lékárně pro konkrétního pacienta a pokrývající 24hodinovou potřebu léčiv

14 Blistr ve veterinární medicíně je:

- a) ostré mazání
- b) puchýř na hrudní končetině koně
- c) dřívější součást postrojů tažných koní způsobující poranění pánevních končetin
- d) perorální léková forma používaná ve veterinární medicíně k léčbě artritid

15 Za otce blistru ve farmacii bývá v literatuře uváděn:

- a) Emmanuel Gross
- b) Heinrich Lang
- c) Karl Klein
- d) Sigfried Kurz

16 Nejčastějšími součástmi blistrů ve veterinární medicíně byly:

- a) rtuť, kantharidin
- b) síra, olovo
- c) zinek, talek
- d) opiová tinktura, yohimbin

17 Jako optimální množství Mg^{2+} v ochranných nápojích je doporučováno:

- a) < 20 mg/l
- b) > 20 mg/l

- c) 0,2 mg/l
- d) 0,1 mg/l

18 K zajištění pitného režimu je vhodné denně pít:

- a) nejméně 0,5 litru silně mineralizované vody
- b) pitnou vodu z vodovodu
- c) nejvýše 0,5 litru středně mineralizované vody
- d) v plném rozsahu konzumovat i slabě mineralizované přírodní minerální vody bez oxidu uhličitého

19 Šaratica je kontraindikována při:

- a) funkční zácpě
- b) ledvinném selhání
- c) dyspepsii
- d) kašli

20 Doporučená denní dávka K^+ je:

- a) 2 000 mg
- b) 2 g
- c) 200 mg
- d) 0,2 g

Správné odpovědi testu číslo 4 / 2011: 1. d; 2. a, b; 3. a; 4. a, b, c, d; 5. a, b; 6. d; 7. b; 8. a; 9. a, b; 10. b; 11. a, b, d; 12. a, c; 13. c, d; 14. a; 15. a, b, c, d; 16. a; 17. c; 18. b; 19. b; 20. c