



Tab. 3. Lékové interakce warfarinu

Skupina	Látky	Mechanismus	Důsledek interakce	Návrh opatření
Ostatní antikoagulancia	všechna	potenciace účinku	↑ krvácivosti	nepodávat současně
Antiagregancia	všechna	potenciace účinku	↑ krvácivosti	zvážit přínos/riziko
Protisekreční léky	omeprazol a další PPI	inhibice CYP2C9	velmi malé ↑ koncentrací i krvácivosti	zkontrolovat INR
Antibiotika	trimetoprim (vč. kotrimoxazolu), metronidazol	inhibice CYP2C9	↑ INR	již s první dávkou ATB snížit dávku warfarinu a poté ji vytitrovat dle INR
	makrolidy, chinolony, TTC, cefaklor, cefixim a cefuroxim	neznámý, v některých případech inhibice CYP3A4 (klarithromycin)	u některých pacientů může dojít ke ↑ INR	s odstupem 4–5 dní od nasazení ATB provést INR a dávku warfarinu případně upravit
	V-PNC a jiné PNC, ostatní cefalosporiny	příčina neznámá	výjimečně dochází ke ↑ INR	někteří autoři i u takových pacientů doporučují s odstupem několika dní zkontrolovat INR
Azolová antimykotika	Itrakonazol, vorikonazol, posakonazol, flukonazol	inhibice CYP3A4, flukonazol též 2C9	↑ INR	monitorovat INR, u flukonazolu ihned snížit dávky warfarinu
Antiarytmika	amiodaron	inhibice CYP2C9	↑ INR	již s první dávkou amiodaronu snížit dávku warfarinu a poté ji vytitrovat dle INR
	dronedaron, propafenon	nejasný	↑ INR	monitorovat INR
Hypolipidemika	simvastatin	inhibice CYP3A4	↑ INR u 14 % populace	zkontrolovat INR několik dní po nasazení, respektive vysazení simvastatinu
	rosuvastatin	nejasný	↑ INR	
	fenofibrát	snad inhibice CYP2C9	možnost ↑ INR	
Glukokortikoidy systémově podané	všechny	nejasný	možnost ↑ INR nebo krvácivých příhod zejména do GIT	zkontrolovat INR několik dní po nasazení, respektive vysazení kortikoidů
Hormony štítné žlázy	levothyroxin, liothyronin	snad ↑ metabolisme srážecích faktorů	možnost ↑ INR nebo krvácivých příhod	zkontrolovat INR několik dní po nasazení, respektive vysazení hormonů štítné žlázy