



Tab. 4. Lékové interakce DOAC

Skupina	Léčivo	Mechanismus	Dabigatran (Pradaxa)	Rivaroxaban (Xarelto)	Apixaban (Eliquis)	Edoxaban (Lixiana)
Ostatní antikoagulancia	všechna	potenciace účinku	zvýšení účinku, kontraindikované			
Antiagregancia	všechna	potenciace účinku	může ↑ riziko krvácení; opatrnost, zvážit přínos/riziko		↑ krvácení, Ki!	může ↑ riziko krvácení
Protisekreční léky	pantoprazol a další PPI	kompetice P-gp	↓ D. o 30 %, NE-rel.	nebyly zjištěny klin. závažné Li		výrobce PPI nezmiňuje
Antimikrobiální léčiva	klarithromycin	inhibice P-gp, CYP3A4	zvýšení D. o 19 %, sledovat	zvýšení R. o 50 %, NE-rel.	↑ A. o 50 %, NE-rel	výrobce nezmiňuje. U erythromycinu ↑ o 85 %: snížení E na 30 mg/d.
	ketokonazol	inhibice P-gp, CYP3A4	zvýšení D. více než 2násobně, Ki	zvýšení R. o 250 %, Ki	zvýšení A. o cca 100 %, ND	zvýšení E. o 87 %: dávky E. pouze 30 mg/d u NVAf a VTE
	flukonazol	inhibice CYP3A4	výrobce Li nezmiňuje, ale opatrně	zvýšení R. o 40 %, NE-rel.	↑ A. o 40 %, NE-rel.	výrobce Li nezmiňuje
	itrakonazol	inhibice P-gp, CYP3A4	zvýšení D., Ki	zvýšení R., ND	zvýšení A., ND	výrobce Li nezmiňuje
	vorikonazol	CYP3A4	výrobce Li nezmiňuje	zvýšení R., ND	zvýšení A., ND	výrobce Li nezmiňuje
	posakonazol	inhibice P-gp, CYP3A4	výrobce doporučuje opatrnost	zvýšení R., ND	zvýšení A., ND	výrobce Li nezmiňuje
	rifampicin	indukce P-gp	snížení D. o 67 %, ND	snížení R. o 49 %, ND	snížení A. o 54 %, ND	snížení E. o 34 %, podávat s opatrností