

**Tab. 3.** Bezpečnostní profil v laktaci u vybraných farmak s hypnotickou indikací

Farmakum	Vazba na proteiny (%)	Biologický poločas (h)	% hladiny matky u dítěte (rozsah)	Úroveň důkazů; počet párů matka-dítě	Nežádoucí účinky u novorozence	Úroveň důkazů; počet párů matka-dítě	Vhodný?
Midazolam	97	1,5–2,5	0,06	OS; 5	NA	Není OS	Ne
Zaleplon	60	0,9 - 1	1,4	OS; 5	NA	Není OS	Ano
Zolpidem	92,5	2,5	NA	Není OS	NA	Není OS	Ano
Zopiklon	45	3,5 - 6	NA	Není OS	NA	Není OS	Ano
Promethazin	93	16 - 19	NA	Není OS	NA	Není OS	Ne

Ve sloupci % hladiny matky u dítěte uvádíme, kolik % z plazmatické hladiny farmaka u matky bylo detekováno u kojeného dítěte. NA = neznámé; Není OS = daná problematika byla zatím zkoumána jen v kazuistikách; OS = prospektivní observační studie. Upraveno dle <https://toxnet.nlm.nih.gov/pda/lactmed.htm> a (30).

Tab. 4. Bezpečnostní profil v laktaci u farmak pro léčbu ADHD

Farmakum	Vazba na proteiny (%)	Biologický poločas (h)	% hladiny matky u dítěte (rozsah)	Úroveň důkazů; počet párů matka-dítě	Nežádoucí účinky u novorozence	Úroveň důkazů; počet párů matka-dítě	Vhodný?
Metylfenidát	10–33	IR 2 OROS 3,5	0,7%	OS; 6	Nepopsány	OS; 7	Ano
Atomoxetin	98	5,2	NA	Není OS	NA	Není OS	Ne

Ve sloupci % hladiny matky u dítěte uvádíme, kolik % z plazmatické hladiny farmaka u matky bylo detekováno u kojeného dítěte. IR = okamžité uvolňování; NA = neznámé; Není OS = daná problematika byla zatím zkoumána jen v kazuistikách OROS= osmoticky kontrolované uvolňování; OS = prospektivní observační studie. Upraveno dle <https://toxnet.nlm.nih.gov/pda/lactmed.htm> a (30).