

**Tab. 1.** Bezpečnostní profil v laktaci u vybraných antipsychotik

Farmakum	Vazba na proteiny (%)	Biologický poločas (h)	% hladiny matky u dítěte (rozsah)	Úroveň důkazů; počet párů matka–dítě	Nežádoucí účinky u novorozence	Úroveň důkazů; počet párů matka–dítě	Vhodný?
Haloperidol	92	12–38	nedetekovatelné	OS; 9	NA	Není OS	Ano
Chlorprothixen	99	8–12	NA	–	NA	–	Ne
Flupentixol	99	19–39	0,6	OS; 1	NA	Není OS	Ne
Amisulprid	17	12–20	3,9–10,7	OS; 5	NA	Není OS	Ne
Klozapin	95	4–12	6,5	OS; 2	NA	Není OS	Ne
Olanzapin	93	24–54	1	OS; 7	sedace	OS; 102	Ano
Kvetiapin	83	6–7	nedetekovatelné	OS; 9	Nepopsány	OS; 6	Ano
Aripiprazol	9	75	NA	Není OS	NA	Není OS	Ne
Risperidon	90	3–20	2,2–4,7	OS; 4	NA	Není OS	Ano
Paliperidon	74	21–30	NA	–	NA	–	Ne
Ziprasidon	99	7–10	NA	–	NA	–	Ne
Sulpirid	40	6–8	2–18	OS; 20	Nepopsány	OS; 24	Ne
Sertindol	99	55–90	NA	–	NA	–	Ne

Ve sloupci % hladiny matky u dítěte uvádíme, kolik % z plazmatické hladiny farmaka u matky bylo detekováno u kojeného dítěte. MA = meta-analýza; NA = neznámé; Není OS = daná problematika byla zatím zkoumána jen v kazuistikách; OS = prospektivní observační studie. Upraveno dle <https://toxnet.nlm.nih.gov/pda/lactmed> a Mohr P a kol. Klinická psychofarmakologie. Praha: Maxdorf s.r.o. 2017. ISBN 978-80-7345-546-0.

že by matka s psychotickým onemocněním mohla svému dítěti ublížit, ale nedostatečné sociální zázemí pro matku a její dítě.

Schopnost vytvářet rané pouto a citové vazby matka–dítě je u žen se schizofrenií narušena i mimo akutní psychotickou fázi (18). U schizofrenie

je více než u jiných nemocí nízká mateřská sensitivita, menší kapacita rozpoznávat emoce a potřeby dítěte, což je způsobeno deficitem v sociální kognici a emočním zpracovávání (19). Nedostatečnou emoční a sociální podporu v dětství zaznamenalo až 50 % dospělých, které vychovával