



Léčivé látky s potenciálem vyvolat fotosenzitivní reakci

Jana Martinásková

Lékárna FN Ostrava

Zejména v jarních a letních měsících bychom měli klást důraz na podání informace ohledně ochrany před slunečním zářením při výdeji léčiv s fotosenzibilizujícím potenciálem. Na úrovni lékáren takto můžeme minimalizovat riziko rozvoje fotosenzitivního nežádoucího účinku a snižovat pravděpodobnost vysazení podávaného léčiva a s tím spojených následných komplikací v léčbě. Článek přináší souhrn vybraných léčivých látek a lékových skupin, u kterých bylo prokázáno klinicky významné riziko rozvoje fotosenzitivní reakce.

Klíčová slova: léčivy vyvolaná fotosenzitivní reakce, fototoxicita, fotosenzibilizující potenciál.

Drugs with potencial to induce photosensitivity

Especially in the spring and summer months, we should emphasize the provision of information on sun protection when dispensing drugs with a photosensitive potential. At the level of pharmacies we can minimize the risk of developing adverse photosensitive drug reaction and reduce the probability of discontinuation of administered drug and associated following complications in treatment. The article presents a summary of selected medication and drug groups for which a clinically significant risk of photosensitivity reaction development has been demonstrated.

Key words: drug-induced photosensitivity, phototoxicity, photosensitizing potential.

KORESPONDENČNÍ ADRESA AUTORA: Mgr. Jana Martinásková, jmartinaskova@seznam.cz
Lékárna FN Ostrava
17. listopadu 1 790/5, 708 00 Ostrava-Poruba

Cit. zkr: Prakt. lékáren. 2021; 17(e2): e3–e13
Článek přijat redakcí: 14. 3. 2021
Článek přijat k publikaci: 13. 5. 2021